

赤ちゃんをワクチンで防げる病気から守ってあげましょう

予防接種スケジュール



完全予約制です

予防接種の望ましい対象年齢表

		2カ月	3カ月	6カ月	9カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	接種回数	接種のポイント・注意事項	
定期接種	Hib(ヒブ) b型インフルエンザ ワクチン	接種開始月齢2ヶ月以上7ヶ月未満					追加接種は初回終了後7ヶ月～13ヶ月の間で行いましょう						4回	初回3回を4～8週間隔で接種、初回終了後7～13ヶ月後に1回接種です。	
	小児用肺炎球菌 ワクチン	接種開始月齢2ヶ月以上7ヶ月未満					追加接種は1歳～1歳3ヶ月の間で行いましょう						4回	初回3回を4週以上の間隔で1歳前までに、初回完了から60日以上あけて追加接種を1歳から1歳3ヶ月までに！	
	4種混合 (百日咳、破傷風、ジフテリア、ポリオ)	1期	接種開始月齢3ヶ月以上11ヶ月未満											4回	初回3回を3～8週間隔で接種、初回終了後、1年の間隔をあげ4回目の接種をします。接種間隔を守りましょう。
	2種混合	2期						小学6年生になったら接種しましょう						1回	小学6年生でジフテリアと破傷風の二種混合を実施（1期の接種歴が必要になります）
	BCG													1回	生後5ヶ月～8ヶ月になるまでの間に接種します。
	水ぼうそう							生後12ヶ月以上15ヶ月未満						2回	1回目と2回目の間隔は、3～12ヶ月まであけます。感染力が非常に強い病気です。
	MR (麻しん風しん混合)	1期						生後12ヶ月以上15ヶ月未満						1回	満1歳になったら早めに接種しましょう
		2期						幼稚園・保育園年長児になったら						1回	小学校就学前の1年間に接種しましょう
	日本脳炎	1期						3歳から4歳に達するまで						3回	6～28日間隔で2回接種。概ね1年あけて3回目を接種します。
		2期						9歳になったら接種しましょう						1回	9歳から10歳に達するまでに4回目を接種します。
B型肝炎		接種開始月齢2ヶ月以上で3回目					H28.4生まれ以降のお子さんがH28.10から定期接種の対象となります						3回	初回接種2回を4週以上あけて接種し、1回目の接種から20～24週間後に3回目を接種します。	
任意接種	ロタウイルス	生後6週から生後24週（6カ月）まで					1回目は、生後14週6日まで。経口ワクチンです。						2回	生後6週間から開始し、4週間以上の間隔で2回接種します。生後24週までに完了しましょう。（有料です）	
	おたふくかぜ						12ヶ月以上から接種出来ます						2回	満1歳と小学校就学前の計2回の接種をお勧めします。（有料です）	



白老町立病院小児科予防接種受付時間

毎週月曜日・火曜日(緊急時の対応を考慮し翌日が休診の場合はお休みです)



受付時間 13時15分～13時45分

接種後は院内にて30分様子を見ていただきます。

