

R8.7月～

## 予防接種スケジュール（白老町）

※五種混合・・・R6年4月以降、従来の四種混合（ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎（ポリオ）・破傷風）にHib感染症が追加され、五種混合が基本となりました。  
 ※肺炎球菌・・・R6年4月以降、従来の13価ワクチンから15価ワクチンの使用が基本となりました。R6年10月以降、20価ワクチンの使用が基本となりました。  
 ※おたふくかぜ・・・R6年4月以降、対象期間（1歳/年長児）に接種した方のおたふくワクチンにかかる費用を町から全額助成します。

| ワクチン名 |                | 0  | 1                                                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3                                              | 4                                           | 5 | 6                                    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |                             |  |   |  |  |   |
|-------|----------------|----|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|
|       |                | 歳  | か                                                            | か | か | か | か | か | か | か | か | か  | か  | 歳 | か | か | か | か | か | か | か | か | か | か  | か  | 歳 | 歳                                              | 歳                                           | 歳 | 歳                                    | 歳 | 歳 | 歳 | 歳  | 歳  | 歳  | 歳  |                             |  |   |  |  |   |
| 経口生   | ロタウイルス         | 定期 |                                                              | ① | ② |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   | ①を生後6週～14週6日までに接種後、4週以上の間隔をあけて生後24週までに②を接種します。 |                                             |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    |                             |  |   |  |  |   |
| 不活化   | 小児用肺炎球菌        | 定期 |                                                              | ① | ② | ③ |   |   |   |   |   |    |    | ④ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |                                                | ①②③を4週以上の間隔で接種後、60日以上あけて1歳3か月までに④を接種します。    |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    |                             |  |   |  |  |   |
| 不活化   | B型肝炎           | 定期 |                                                              | ① | ② |   |   |   |   | ③ |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |                                                | ①②を4週以上の間隔で接種後、①の接種から20～24週あけて1歳までに③を接種します。 |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    |                             |  |   |  |  |   |
| 不活化   | 五種混合           | 定期 |                                                              | ① | ② | ③ |   |   |   |   |   |    | ④  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |                                                | ①②③を3週～8週間隔で接種後、6～18か月あけて④を接種します。           |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    |                             |  | ① |  |  |   |
| 注射生   | BCG            | 定期 |                                                              |   |   |   | ① |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |                                                |                                             |   | 二種混合：小学6年生で接種します。<br>※五種混合の接種歴が必要です。 |   |   |   |    |    |    |    |                             |  |   |  |  |   |
| 注射生   | MR<br>(麻しん風しん) | 定期 |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ① |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |                                                |                                             |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    | ②                           |  |   |  |  |   |
| 注射生   | 水痘             | 定期 |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ① |   |   |   |   |   | ② |   |   |   |    |    |   |                                                |                                             |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    | ①を接種後、6～12か月の間隔をあけて②を接種します。 |  |   |  |  |   |
| 注射生   | おたふくかぜ         | 任意 |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ① |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |                                                |                                             |   |                                      |   |   |   |    |    |    |    | ①は満1歳、②は小学校就学前の接種をお勧めします。   |  |   |  |  |   |
| 不活化   | 日本脳炎           | 定期 | 3歳～4歳に①②を4週間隔で接種後、1年の間隔をあけて③を接種、おおむね5年の間隔をあけて9歳～10歳に④を接種します。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   | ①                                              | ②                                           | ③ |                                      |   |   |   |    |    |    |    |                             |  |   |  |  | ④ |

不 不活化ワクチン

生 ワクチン（注射の場合、接種後4週間、他の注射生ワクチン接種ができません。）

定期接種対象年齢（定められた期間内で受ける場合は無料）

任意接種対象年齢（有料）

←○→ おすすめ接種時期（数字は接種回数）

同時接種（同時に複数のワクチンを接種します。）※白老町立病院では4本ま